

D Kann ein gesundes Darmmilieu und eine optimale Energieverwertung fördern, den Leberstoffwechsel entlasten und somit die Rekonvaleszenz in Genesungsphasen positiv unterstützen. **Praxistipp:** Nach Wurmkuren oder kurzzeitiger Antibiotikatherapie 1 Injektor auf 3 Tage verteilt geben. Nach langzeitiger Antibiotikatherapie nach Verordnung des Tierarztes. **Verwendungshinweis:** 20 ml täglich über 4–6 Wochen. Bei Fohlen ab dem 3. Tag bis zu 20 ml täglich oder nach Ermessen des Tierarztes. **Zusammensetzung:** Milchsauer fermentiertes Topinamburkonzentrat. **Analytische Bestandteile:** 0% Rohfaser, 0% Stärke, 35% Feuchte. **Hinweise:** Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis / Kennnummer der Partie: Siehe separate Kennzeichnung.

EN Can promote a healthy intestinal environment and optimal energy utilisation, relieve liver metabolism and thus positively support convalescence in recovery phases.

Helpful tip: After worming or short-term antibiotic therapy, give 1 syringe spread over 3 days. After long-term antibiotic therapy according to the veterinarian's prescription. **Application:** 20 ml daily for 4–6 weeks. In foals from day 3 up to 20ml daily or at the discretion of the veterinarian. **Ingredients:** Lactic fermented Jerusalem artichoke juice concentrate. **Nutrient specification:** 0% crude fibre, 0% starch, 35% moisture. **Notes:** Store in a hygienic, cool and dry place. Keep out of direct sunlight. No liability in case of improper storage. Batch number/ best before date: See separate label.

F Peut favoriser un environnement intestinal sain et une utilisation optimale de l'énergie, soulager le métabolisme hépatique et ainsi soutenir positivement la guérison pendant les phases de convalescence.

Conseil pratique : Après une vermifugation ou une antibiothérapie de courte durée, donner 1 seringue répartie sur 3 jours. Après une antibiothérapie de longue durée, demander conseil à un vétérinaire. **Recommandation de dosage :** 20 ml par jour pendant 4 à 6 semaines. Pour les poulains à partir du 3e jour, jusqu'à 20 ml par jour ou selon la décision du vétérinaire. **Composition :** Concentré de jus de topinambour à fermentation lactique. **Constituants analytiques :** 0% fibres brutes, 0% amidon, 35% humidité. **Remarque :** Stocker de manière hygiénique, dans un endroit frais et sec. Protéger des rayons du soleil. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de stockage non conforme. Date limite d'utilisation optimale et numéro de lot : Voir étiquetage séparé.

NL Kan een gezond darmmilieu en een optimale energiebenutting bevorderen, de leverstoffwisseling ontlasten en zo het herstel in herstellfasen positief ondersteunen.

Praktische tip: Geef na het ontwormen of een antibioticumkuur op korte termijn 1 injector verdeeld over 3 dagen. Na langdurige antibiotica therapie volgens voorschrift van de dierenarts. **Voedingsadvies:** 20 ml per dag gedurende 4–6 weken. Bij veulens vanaf dag 3 tot 20 ml per dag of volgens voorschrift van de dierenarts. **Samenstelling:** Melkzuurgesticht concentraat van het sap van de aardpeer. **Analytische bestanddelen:** 0% ruwe celstof, 0% zetmeel, 35% vochtgehalte. **Aanwijzing:** Hygiënisch, koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht. Bij onjuiste opslag geen aansprakelijkheid. Ten minste houdbaar tot en charge-nummer: Zie afzonderlijke etikettering.

IT Può favorire una sana flora intestinale ed un utilizzo ottimale delle risorse energetiche, può inoltre aiutare il metabolismo epatico e, di conseguenza, sostenere positivamente durante la convalescenza.

Suggerimento: somministrare 1 siringa suddividendola in 3 giorni a seguito di sverminante o brevi terapie con antibiotici. Dopo terapie con antibiotici prolungate solo previo indicazione del veterinario. **Dosaggio consigliato:** 20 ml al giorno per 4–6 settimane. Per puledri a partire dal 3° giorno di vita fino a 20 ml al giorno o secondo l'indicazione del veterinario. **Composizione:** succo di topinambur concentrato trattato con fermentazione lattica. **Componenti analitici:** 0% fibre grezze, 0% amidi, 35% umidità. **Avvertenza:** Conservare in luogo igienico ed asciutto. Proteggere dai raggi solari. Non si risponde per una conservazione impropria del prodotto. Da consumarsi preferibilmente entro il / Lotto n°: Vedi marcatura separata.

Mit Topinambur
With Jerusalem artichoke
Contient du topinambour
Met aardpeer
Con topinambur



MediPaste — INTESTINUM —



Magenschonend
Stomach friendly
Respectueux de la
flore intestinale
Makkelijk voor de maag
Per stomach sensible



Verdauungsfördernd
Aids digestion
Facilite la digestion
Spijverteringsbevorderend
Favorisce la digestione



Intakte Darmflora
Intact intestinal flora
Préserve la flore intestinale
Intacte darmflora
Flora intestinale sana

Felix Bühler
Ringstrasse Nord 43
5600 Lenzburg
Schweiz


Kraemer-Pferdesport
4. Industriestraße 1 + 2
68764 Hockenheim-Falhaus
Germany

Nettovolumen - Net volume
Volume net - Nettovolume - Volume netto

60 ml

Einzel Futtermittel für Pferde
Feed material for horses
Aliment concentré simple pour chevaux
Rechtstreeks voer voor paarden
Mangime semplice per cavalli

490885-40/DE-BY-1-00191



MediPaste
— INTESTINUM —